

综合练习三

一、A 型选择题

1. 脊柱

- A. 在垂直轴上可作旋转运动
- B. 在矢状轴上可作伸屈运动
- C. 侧面观可见一个个椎孔
- D. 有颈胸腰三个弯曲
- E. 以上都不对

2. 不与颅中窝直接相通的孔是

- A. 视神经孔
- B. 棘孔
- C. 颈静脉孔
- D. 圆孔
- E. 卵圆孔

3. 椎间盘

- A. 连于相邻的椎弓之间
- B. 脊柱颈部椎间盘最薄
- C. 全部椎间盘的厚度占脊柱长 1/3
- D. 其髓核来源于胚胎时的脊索
- E. 其纤维环以前部为最薄

4. 膝关节的后交叉韧带

- A. 位于关节腔内
- B. 起于股骨外侧髁的内面
- C. 防止胫骨后移
- D. 止于胫骨髁间隆起的前方
- E. 伸膝时最紧张

5. 一侧胸锁乳突肌收缩可使头

- A. 屈向同侧
- B. 向对侧屈
- C. 屈向同侧面向对侧

D. 屈向同侧面向同侧

E. 屈向对侧面向同侧

6. 有关膈的描述错误的是

A. 为主要的呼吸肌

B. 膈肌腱叫中间腱

C. 主动脉裂孔平第 12 胸椎

D. 食管裂孔平第 10 胸椎

E. 腔静脉孔平第 8 胸椎

7. 腹内斜肌不参与构成

A. 腹直肌鞘前层

B. 腹直肌鞘后层

C. 腹股沟韧带

D. 腹股沟镰

E. 提睾肌

8. 面肌不包括

A. 颅顶肌

B. 眼轮匝肌

C. 口轮匝肌

D. 鼻肌

E. 颞肌

9. 咽鼓管咽口位于

A. 鼻咽部侧壁

B. 口咽部侧壁

C. 喉咽部侧壁

D. 鼻腔侧壁

E. 以上都对

10. 何者汇合成胆总管

A. 左右肝管

B. 肝总管与胰管

C. 左右肝管与胆囊管

D. 肝总管与胆囊管

E. 胆囊管与胰管

11. 气管向上直接通

A. 喉中间腔

B. 喉室 C. 喉前庭

D. 声门下腔

E. 以上都对

12. 牙

A. 分恒牙和乳牙

B. 分体颈根三部分

C. 牙颈被牙龈包绕

D. 牙体为露出部分

E. 牙根内腔为牙腔

13. 胆囊

A. 分底体颈管四部分

B. 产生胆汁

C. 位于方叶左侧

D. 属于腹膜内位器官

E. 胆囊管与肝管合成胆总管

14. 肛管

A. 长5-6cm

B. 有横皱襞

C. 痔发生在齿状线上方

D. 平滑肌形成内括约肌

E. 横纹肌形成外括约肌

15. 肝的位置

A. 右叶可延伸至左季肋区

B. 上界在右锁骨中线平第 5 肋

C. 成人和小儿肝下界相同

D. 肝门与胆囊相邻

E. 上面左右同高

16. 输尿管

- A. 长约 50cm
- B. 腹段沿腰方肌前面下行
- C. 在小骨盆入口处经髂总动脉末端前方
- D. 开口于膀胱颈
- E. 膀胱充盈时壁内段闭合

17. 输精管结扎常选择在

- A. 睾丸部
- B. 精索部
- C. 腹股沟部
- D. 盆部
- E. 以上都不是

18. 精液产生于

- A. 睾丸
- B. 附睾
- C. 前列腺
- D. 精囊
- E. 前列腺和睾丸

19. 女性乳房

- A. 乳腺有 15-20 个乳腺小叶构成
- B. 乳房皮肤橘皮样变是乳腺癌的象征
- C. 输乳管粗细均匀，开口于乳头
- D. 皮肤与乳腺间连有乳房悬韧带
- E. 乳房手术常选用环行切口

20. 胃后壁穿孔胃的内容物首先进入

- A. 肝肾隐窝
- B. 网膜囊
- C. 左肝下前间隙
- D. 直肠膀胱陷凹
- E. 右肝下间隙

21. 大网膜

- A. 为双层腹膜结构

- B. 构成网膜囊前、后、下壁
- C. 上缘附着于胃小弯
- D. 右侧部称肝十二指肠韧带
- E. 以上都不对

22. 膀胱三角

- A. 位于膀胱底部内面
- B. 粘膜与粘膜下层相连
- C. 膀胱膨胀时粘膜皱襞消失
- D. 膀胱空虚时粘膜形成许多皱襞
- E. 以上都不对

23. 子宫

- A. 其内腔称子宫腔
- B. 子宫下段来源于子宫体
- C. 子宫颈下端在坐骨棘平面稍上方
- D. 未产妇的子宫口呈横裂形
- E. 癌肿好发于子宫底

24. 十二指肠

- A. 呈C 字形, 长约 25cm
- B. 上部又称球部
- C. 降部为外位器官
- D. 末段为水平部
- E. 水平部平第 1 腰椎

25. 肺门结构

- A. 由前向后为动脉、静脉、支气管
- B. 由前向后为静脉、支气管、动脉
- C. 由前向后为支气管、静脉、动脉、
- D. 肺动脉内含静脉血
- E. 肺动脉内含动脉血

26. 开口于右心房的静脉不包括

- A. 上腔静脉
- B. 下腔静脉

C.肺静脉

D.冠状窦

E.心前静脉

27. 右冠状动脉不供应

A.窦房结

B.房室结

C.左心室后壁

D.室间隔前 2/3

E.右心室

28. 肾动脉

A.平第1 腰椎发自腹主动脉

B.经肾静脉和肾盂后方入肾门

C.左侧比右侧长

D.只供应肾脏血液

E.在肾实质内按肾段分布

29. 面动脉起于

A.颈内动脉

B.颈总动脉

C.颈外动脉

D.颈总动脉分叉处

E.颈外动脉的终支之一

30. 主动脉弓的分支是

A.左头臂干 B.右锁骨下动脉 C.左锁骨下动脉

D.右颈总动脉 E.左右冠状动脉

31. 营养肝的血管是

A.门静脉

B.脾动脉

C.主动脉腹部

D.肝固有动脉

E.肠系膜上动脉

32. 股动脉

- A. 是髂内动脉的延续
- B. 经腹股沟韧带深面
- C. 位于股静脉的内侧
- D. 在 窝处移行为胫后动脉
- E. 以上都不对

33. 营养肺的支气管动脉属于

- A. 肺循环
- B. 冠状循环
- C. 侧副循环
- D. 体循环
- E. 微循环

34. 上腔静脉

- A. 有两个属支
- B. 由左右头臂静脉合成
- C. 位于右肺根之后
- D. 经主动脉的左侧
- E. 穿过肝脏

35. 形成静脉角夹角的是

- A. 左、右头臂静脉
- B. 上、下腔静脉
- C. 颈、内外静脉
- D. 锁骨下静脉与颈内静脉
- E. 锁骨下静脉与颈外静脉

36. 门静脉收集静脉血的范围

- A. 肝
- B. 直肠上下部
- C. 胆囊
- D. 食管上下段
- E. 以上都不对

37. 胸导管 B

- A. 注入右侧静脉角

- B. 穿过膈肌的主动脉裂孔
- C. 收集收集右半身的淋巴
- D. 管腔内无瓣膜
- E. 以上都不对

38. 门静脉系与上下腔静脉系的吻合为

- A. 食管静脉丛
- B. 直肠静脉丛
- C. 脐周静脉网
- D. 脊柱静脉丛
- E. 以上都正确

39. 大隐静脉比较恒定经过

- A. 内踝前方
- B. 内踝后方
- C. 外踝前方
- D. 外踝后方
- E. 以上都不对

40. 直接注入下腔静脉的是

- A. 门静脉
- B. 脾静脉
- C. 左侧睾丸静脉
- D. 肝静脉
- E. 肠系膜下静脉

41. 房水

- A. 产生于虹膜
- B. 经虹膜角膜角吸收
- C. 仅充满于角膜与虹膜之间
- D. 注入巩膜静脉窦
- E. 无屈光作用

42. 眼球不能转向下外，瘫痪的眼肌是

- A. 提上睑肌
- B. 上直肌

C. 内直肌

D. 下斜肌

E. 上斜肌

43. 对晶状体描述错误的是

A. 是屈光系统的主要部分

B. 位于虹膜与玻璃体之间

C. 晶状体囊连有睫状小带

D. 晶状体中央部较软称皮质

E. 为富有弹性的双凸透镜

44. 对鼓膜描述错误的是

A. 是外耳的一部分

B. 位于外耳道与鼓室之间

C. 成人与外耳道底约呈 45 度夹角

D. 穿孔好发于松弛部

E. 光锥消失为鼓膜内陷的主要标志

45. 关于鼓岬描述错误的是

A. 位于迷路壁的中部

B. 成自耳蜗第 1 圈的隆起

C. 其下方有咽鼓管鼓室口

D. 其后上方有前庭窗

E. 其后下方有蜗窗

46. 肱骨中段骨折易致

A. 翼状肩

B. 方肩

C. 爪形手

D. 垂腕

E. 猿掌

47. 股神经

A. 支配股薄肌

B. 起于骶丛

C. 出梨状肌下孔

- D. 支配股四头肌
- E. 位于股动脉内侧

48. 脊髓、脊神经属于混合性质的是

- A. 前根
- B. 前角
- C. 后角
- D. 侧角
- E. 前支

49. 动眼神经损伤不出现的症状是

- A. 瞳孔散大
- B. 上睑下垂
- C. 外斜视
- D. 瞳孔不能转向外下方
- E. 眼不能向上凝视

50. 交感神经的低级中枢位于

- A. 上涎核
- B. 下涎核
- C. 脊髓中间外侧柱
- D. 迷走神经背核
- E. 以上都不是

51. 不属于内脏感觉特点的是

- A. 对切割刺激不敏感
- B. 对牵拉刺激敏感
- C. 一般刺激强度不产生感觉
- D. 疼痛定位准确
- E. 以上都不是

52. 灰交通支是 B

- A. 交感神经节前纤维
- B. 交感神经节后纤维
- C. 副交感神经节前纤维
- D. 副交感神经节后纤维

E. 以上都不是

53. 右手不能辨别物体的纹理，损伤的是

A. 右侧薄束

B. 右侧楔束

C. 左侧薄束

D. 左侧楔束

E. 以上均不是

54. 第 7 胸髓后方对应椎骨的椎弓板是

A. T3

B. T4

C. T5

D. T6

E. T10

55. 何出处病变可出现瞳孔如针尖大小

A. 脊髓前角

B. 脊髓后角

C. 脊髓侧角

D. 动眼神经副核

E. 睫状神经节

56. 内侧丘系交叉于

A. 脊髓

B. 延髓

C. 脑桥

D. 中脑

E. 延髓锥体交叉水平

57. 锥体交叉是

A. 锥体系纤维全部交叉

B. 锥体系纤维部分交叉

C. 交叉纤维形成皮质脊髓前束

D. 不交叉纤维形成皮质脊髓侧束

E. 交叉纤维形成皮质核束

58. 只接受对侧皮质核束纤维的是

- A. 疑核上半
- B. 疑核下半
- C. 展神经核
- D. 面神经核
- E. 舌下神经核

59. 属于脑神经核的是

- A. 红核
- B. 上橄榄核
- C. 孤束核
- D. 下橄榄核
- E. 薄束核

60. 丘脑腹后内侧核接受的纤维是

- A. 外侧丘系
- B. 内侧丘系
- C. 三叉丘系
- D. 脊髓丘系
- E. 以上都不是

61. 大脑皮质

- A. 颞上回为听觉中枢
- B. 角回为视觉中枢
- C. 旁中央小叶后部为感觉中枢
- D. 额中回上部为说话中枢
- E. 额下回为书写中枢

62. 左侧大脑中央后回下部病变出现

- A. 左侧面瘫
- B. 左侧下肢感觉丧失
- C. 右侧面部感觉丧失
- D. 右侧面瘫
- E. 右侧下肢感觉丧失

63. 皮质核束通过内囊的

- A. 前脚
- B. 膝部
- C. 后角
- D. 最后端
- E. 以上均对

64. 组成纹状体的是

- A. 豆状核和杏仁体
- B. 杏仁体和屏状核
- C. 屏状核和尾状核
- D. 尾状核和豆状核
- E. 屏状核和豆状核

65. 后丘脑

- A. 由内、外侧膝状体组成
- B. 内侧膝状体与视觉有关
- C. 外侧膝状体与听觉有关
- D. 是视听反射中枢部位
- E. 以上均不对

66. 垂体瘤压迫视交叉可出现

- A. 左眼颞侧视野偏盲
- B. 右眼颞侧视野偏盲
- C. 双眼颞侧视野偏盲
- D. 双眼对侧视野同向偏盲
- E. 以上都不对

67. 面神经核上瘫区别于核下瘫的是

- A. 口角下垂
- B. 鼻唇沟变浅
- C. 两侧额纹正常
- D. 不能鼓腮
- E. 以上都不是

68. 脊髓被膜由外向内是

- A. 蛛网膜、硬脊膜、软脊膜

- B. 软脊膜、蛛网膜、硬脊膜
- C. 硬脊膜、蛛网膜、软脊膜
- D. 硬脊膜、软脊膜、蛛网膜
- E. 软脊膜、硬脊膜、蛛网膜

69. 硬膜外麻醉须经过

- A. 前纵韧带
- B. 后纵韧带
- C. 黄韧带
- D. 硬脊膜
- E. 蛛网膜

70. 不参与构成基底动脉环的是

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 颈内动脉
- E. 后交通动脉

71. 不穿过海绵窦的是

- A. 动眼神经
- B. 滑车神经
- C. 眼神经
- D. 视神经
- E. 颈内动脉

72. 腮腺床的构成不包括

- A. 颈外动脉
- B. 颈内动脉
- C. 舌咽神经
- D. 迷走神经
- E. 舌下神经

73. 气管切开头部应

- A. 正中后仰
- B. 后仰

C.前屈

D.侧屈

E.侧屈后仰

74. 支配环甲肌的是

A.喉上神经喉外支

B.喉上神经喉内支

C.颈袢

D.喉返神经

E.喉下神经

75. 甲状腺肿大可出现的压迫症状有

A.呼吸困难

B.吞咽困难

C.声音嘶哑

D.Horner 综合征

E.以上均可出现

76. 分布于脐平面的神经是

A.第6 胸神经

B.第8 胸神经

C.第10 胸神经

D.第12 腰神经

E.第1 腰神经

77. 腹股沟管

A.腹股沟三角内

B.前壁腹外斜肌腱膜和腹内斜肌起始部

C.下壁为腹内斜肌腱膜

D.后壁外侧部为腹横肌

E.上壁为腹外斜肌

78. 对疝的描述错误的是

A.斜疝经过深环向外突出

B.斜疝内容物可突至阴囊

C.斜疝可直接经腹股沟三角突出

D.斜疝不一定突出至浅环

E.直疝不能突至阴囊

79. 不属于壁胸膜的是

A.肋胸膜

B.膈胸膜

C.胸膜顶

D.肺胸膜

E.纵隔胸膜

80. 经肺根前方走行的是

A.迷走神经

B.膈神经

C.胸导管

D.奇静脉

E.胸交感干

81. 动脉导管三角内有

A.淋巴结

B.右喉返神经

C.左迷走神经

D.左喉返神经

E.以上均不对

82. 发生右侧乳糜胸损伤的是

A.胸导管上段

B.胸导管中段

C.胸导管下段

D.乳糜池

E.以上都不是

83. 高选迷切治疗胃溃疡应切断

A.肝支

B.腹腔支

C.贲门支、胃底支和胃体支

D.鸦爪支

E. 胃前、后支

84. 胆总管浅且易于暴露的是

A. 十二指肠上段

B. 十二指肠后段

C. 胰腺段

D. 肝胰壶腹

E. 十二指肠壁内段

85. 仰卧时腹膜腔的最低位置在

A. 左肝下前间隙

B. 网膜囊

C. 右肝上间隙

D. 肝肾隐窝

E. 左肝上前间隙

86. 肾蒂主要结构由前向后为

A. 肾动脉、肾静脉、肾盂

B. 肾静脉、肾动脉、肾盂

C. 肾盂、肾动脉、肾静脉

D. 肾静脉、肾盂、肾动脉

E. 肾动脉、肾盂、肾静脉

87. 腹膜腔

A. 是腹壁围成的腔隙

B. 与外界相通

C. 腔内为负压

D. 是一个潜在的腔隙

E. 内有内脏器官和结构

88. 寻找阑尾最佳的方法是

A. 在右髂窝处

B. 沿回肠末端追踪

C. 沿结肠带追踪

D. 先找到盲肠

E. 沿回结肠动脉追踪

89. 胰头癌向后易压迫

- A. 脾血管
- B. 胆总管
- C. 肠系膜上血管
- D. 腹主动脉
- E. 下腔静脉

90. 结石阻塞胆道而无黄疸，阻塞部位在

- A. 胆总管
- B. 肝总管
- C. 胆囊管
- D. 左肝管
- E. 右肝管

91. 肛门指诊不易触及

- A. 前列腺
- B. 精囊腺
- C. 子宫颈
- D. 输精管壶腹
- E. 输尿管

92. 子宫的正常姿势为

- A. 前倾
- B. 后倾
- C. 前倾前屈
- D. 前倾后屈
- E. 后倾前屈

93. 内痔和外痔的分界线是

- A. 肛直线
- B. 齿状线
- C. 痔环
- D. 肛白线
- E. 肛缘线

94. 肛直肠环的组成不包括

- A. 肛门外括约肌皮下部
- B. 肛门外括约肌浅部
- C. 肛门外括约肌深部
- D. 耻骨直肠肌
- E. 直肠纵肌

95. 沿胸外侧血管附近排列的淋巴结为

- A. 锁骨下群
- B. 胸肌淋巴结群
- C. 中央群
- D. 外侧群
- E. 肩胛下群

95. 不通过腕管的结构为

- A. 正中神经
- B. 尺神经
- C. 指浅屈肌腱
- D. 指深屈肌腱
- E. 拇长屈肌腱

96. 在臂中份横断面上看不到

- A. 正中神经
- B. 尺神经
- C. 桡神经
- D. 肌皮神经
- E. 腋神经

97. 紧贴腘窝底的结构为

- A. 坐骨神经
- B. 腓总神经
- C. 胫神经
- D. 腘动脉
- E. 腘静脉

98. 臀肌注射常选择在臀部的

- A. 外上 1/4

- B. 外下 1/4
- C. 内上 1/4
- D. 内下 1/4
- E. 以上均可

99. 足背动脉

- A. 为胫后动脉的直接延续
- B. 与神经伴行
- C. 经内外踝连线的中点
- D. 通过踝管
- E. 于第 1 跖间隙分为足底内外侧动脉

100. 膝关节外下处外伤易伤及

- A. 腓总神经
- B. 腓浅神经
- C. 腓深神经
- D. 胫神经
- E. 腓肠

